

โรคพิษสุนัขบ้า (RABIES)

โรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคกลัวน้ำเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคที่อันตรายร้ายแรงมาก โรคนี้เกิดในสัตว์เลือดอุ่น โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น แมว ชะนี ลิง กระจอก กระแต หนู วัว ควาย แพะ แกะ หมู ค้างคาว รวมทั้งคนด้วย ในประเทศไทยพาหะแพร่เชื้อที่สำคัญคือสุนัข รองลงมาคือ แมว เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จะปนเปื้อนอยู่ในน้ำลายของสัตว์เหล่านี้ ผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายใน 7 วันหลังจากมีอาการ



การติดต่อ

เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ในน้ำลายของสัตว์ที่เป็นโรค ติดต่อสู่คนโดยทางบาดแผลที่ถูกสัตว์กัด ข่วน เลีย รวมทั้งแผลอื่น ๆ และทางเยื่อเมือกของปาก จมูก ตา โรคนี้ติดต่อได้ตั้งแต่มก่อนสัตว์แสดงอาการประมาณ 1 - 6 วัน

ระยะติดต่อในคนที่ได้รับ

เชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะฟักตัว 18 - 60 วัน หรืออาจนานเป็นปี ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ขนาดของแผล ความลึกของแผล ระยะทางใกล้ไกลจากสมอง หรือบริเวณที่ถูกกัดมีเส้นประสาทมากหรือน้อย และปริมาณของเชื้อ

ระยะฟักตัวในสุนัข


สุนัขเมื่อได้รับเชื้อจะมีระยะฟักตัว 7 วันถึง 6 เดือน ขึ้นกับบริเวณที่ได้รับเชื้อ และความรุนแรงของเชื้อ โดยเฉลี่ยประมาณ 2 - 6 สัปดาห์

อาการในสุนัข มี 2 แบบ คือ

ชนิดซึม เมื่อสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีนิสัยแปลกไปจากเดิม ชอบซุกตามมุมมืด กินอาหาร กินน้ำน้อยลง ถ้าถูกรบกวนจะดุร้าย ต่อมาจะเป็นอัมพาตและตาย

ชนิดดุร้าย สุนัขจะมีอาการกระวน

กระวาย หงุดหงิด ดุร้าย ขากรรไกรแข็ง ปากอ้า ลิ้นห้อย น้ำลายไหล ม่านตาขยาย วิ่งโดยไม่มีจุดหมาย ต่อมาจะมีอาการอัมพาต เริ่มจากกล้ามเนื้อคอ ทำให้ก้นน้ำลำบาก ระบบหายใจล้มเหลวและตาย รวมระยะเวลาเริ่มแสดงอาการจนตายประมาณ 10 วัน



สัตว์กักจะทำอย่างไร

1. ล้างแผล ต้องรีบล้างแผลด้วยสบู่กับน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง ใส่ยาใส่แผล เช่น ทิงเจอร์ หรือโพวีดีน จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้



2. กักสัตว์ที่กัดไว้ เพื่อดูอาการอย่างน้อย 15 วัน เว้นแต่สัตว์นั้นดุร้ายกัดคนหรือสัตว์อื่น หรือไม่สามารถกักสัตว์ไว้ได้ให้ทำลาย ถ้าสัตว์หนีหายไปให้ถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
3. ไปพบแพทย์ หากถูกสัตว์กัด ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา หรือฉีดวัคซีน และ ซีรัม อย่ารอจนสัตว์ที่กัดตาย

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

1. ไม่ควรเล่นคลุกคลีกับสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข ไม่มีเจ้าของ คุณเลบุดรหลานไม่ให้เล่นคลุกคลีกับสัตว์ไม่มีเจ้าของ ไม่ช่วยสุนัขให้โมโห
2. ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้าน สุนัขจรจัดที่อยู่ข้างถนนเป็นตัวแพร่เชื้อที่สำคัญ อาจกัดคนหรือสัตว์ที่สัญจรไปมา ทำให้โรคพิษสุนัขบ้าแพร่กระจายต่อไป
3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากับสัตว์เลี้ยงทุกปี ซึ่งเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องนำสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข แมว อายุระหว่าง 2 - 4 เดือน ไปรับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคและฉีดซ้ำตามที่สัตวแพทย์แนะนำ

4. คอยกักสัตว์เลี้ยงโดยการฉีดยาคุมกำเนิดให้สุนัขหรือแมวตัวเมีย หรือผ่าตัดทำหมันทั้งตัวผู้และตัวเมีย เพื่อไม่ให้มีลูกมากเกินไปจนไม่อาจเลี้ยงดูได้และไม่ควรนำไปปล่อยให้กลายเป็นสุนัขจรจัด

โรคพิษสุนัขบ้า
อันตราย
ป้องกันไว้
จะปลอดภัย

โรคพิษสุนัขบ้า (RABIES)



จัดทำโดย ... กลุ่มงานสุขศึกษา
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
โทร. 0 - 5621 - 9888 ต่อ 5200, 9801